



Sujet n° X : scénario

Auteur : Manon Neumann (DES Pédiatrie)

Relecteur : Alexandre BUGADA (DES Pédiatrie)

DOCUMENT POUR L'ACTEUR

Par défaut, tous les éléments doivent être demandés par le candidat.

Ce que tu peux dire spontanément est clairement indiqué.

Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Phrase brève et peu informative que le PSS peut formuler au début de la station : « bonjour, je suis l'externe des urgences, je t'appelle parce que j'ai examiné Mr IKKS qui s'est présenté pour douleur testiculaire et j'aurais besoin d'un avis urologique »

1) Informations détaillées :

Professionnel de Santé Standardisé : PSS

Informations sur le patient :

Nom: GIGOT

Prénom: Mattéo

Age: 23 ans

Sexe : Station mixte (à préférer): Homme impérativement

Taille : 185 cm Poids : 78 kg IMC : 22,8 kg/m²

Situation :

Situation familiale

Statut: célibataire Nombre d'enfant(s) et âge des enfants: 0

Profession : étudiant en droit

Antécédents :

Personnels : RAS

Vaccins : à jour pour l'âge

Allergies connues : non

Familiaux : RAS

Traitements :

Traitements médicamenteux : NON

Traitements non médicamenteux : NON

Habitudes de vie

Habitudes de vie : sportif, boxe 3 fois par semaine ; rapports sexuels protégés

Dépendances et/ou addictions : tabac 5 PA, alcool occasionnel

Sédentarité : non

Histoire actuelle

Motif de consultation : douleur testiculaire

Description des symptômes : douleur testiculaire droite

Mode d'apparition, ancienneté et évolution des symptômes : depuis 1 heure, brutalement, spontanée, intense 9/10, continue, irradiant vers la région inguinale, non soulagée par la prise de PARACÉTAMOL, pas d'autre épisode, pas de notion de traumatisme

Gêne la marche, pas de position antalgique

Signes associés : 1 épisode de vomissement, nausées importantes

Retentissement des symptômes : douleur intense en chien de fusil

Descriptions des signes absents (éventuellement pour que l'étudiant élimine des diagnostics différentiels) : apyrétique, pas de douleur lombaire (spontanée ou à la manoeuvre d'ébranlement), pas de dysurie, pas de brûlures mictionnelles

2) Consignes spécifiques :

Pas de rapports sexuels à risque, une relation stable depuis 1 an et demi, préservatifs lors des rapports, derniers tests IST il y a 1 an négatifs, donne son sang régulièrement.

Examen clinique : Répondre au fur et à mesure

- Bourse droite très douloureuse, sensible, inflammatoire augmentée de volume, rouge et chaude
- Lors des manoeuvres de soulèvement la bourse reste douloureuse (signe de Prehn négatif)
- Le testicule est ascensionné, rétracté à l'anneau inguinal
- Palpation de tours de spires
- Le réflexe crémastérien est absent
- Testicule GAUCHE sans anomalie
- Absence d'écoulement urétral
- Orifices herniaires libres
- Abdomen souple, dépressible, indolore
- Pas de douleur lombaire
- Pas de défense ni contracture

Reste de l'examen clinique sans particularité

Pour toute autre question : répondre que l'examen est normal